

Integrazione numerica

Lucia Gastaldi

DICATAM - Sez. di Matematica,
<http://lucia-gastaldi.unibs.it>



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

- 1 Formule di quadratura semplici e composite
 - Formule di quadratura
 - Grado di precisione
 - Formule di base
 - L'integrazione numerica con MATLAB

- 2 Formule adattative

Integrazione di funzioni

Problema

Data la funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, si calcoli il valore dell'integrale

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

Una **formula di quadratura** ci permette di ottenere un valore approssimato dell'integrale della funzione a partire dai valori di f come segue:

$$\mathcal{I}(f; a, b) = \sum_{i=0}^n \omega_i f(x_i).$$

I punti x_i si dicono **nod**i;
i coefficienti ω_i si dicono **pesi**.

Grado di precisione della formula di quadratura

Definizione

Si dice che una **formula di integrazione numerica** ha **grado di precisione** p se vale che

$$I(f) = \mathcal{I}(f) \text{ per ogni polinomio } f \text{ di grado } \leq p;$$

$$I(f) \neq \mathcal{I}(f) \text{ per ogni polinomio } f \text{ di grado } > p.$$

Formula del punto medio

Nodi: punto medio dell'intervallo $(a + b)/2$

Formula del punto medio

$$\mathcal{I}_{PM}(f) = (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right).$$

Grado di precisione: 1

Formula composta del punto medio

$$\mathcal{I}_{PM}^c(f) = H \sum_{k=1}^N f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) \quad \text{essendo } H = \frac{b - a}{N}.$$

Errore: $E_{PM}^c(f) = I(f) - \mathcal{I}_{PM}^c(f) = \frac{b - a}{24} H^2 f''(\xi_0)$

Formula dei trapezi

Nodi: gli estremi dell'intervallo a , b .

Formula dei trapezi

$$\mathcal{I}_T(f) = \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b)).$$

Grado di precisione: 1

Formula composta dei trapezi

$$\mathcal{I}_T^c(f) = H \left(\frac{f(a)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + \frac{f(b)}{2} \right) \quad \text{essendo } H = \frac{b-a}{N}.$$

Errore: $E_T^c(f) = I(f) - \mathcal{I}_T^c(f) = -\frac{b-a}{12} H^2 f''(\xi_0)$

Formula di Cavalieri-Simpson

Nodi: gli estremi ed il punto medio dell'intervallo $a, b, (a + b)/2$.

Formula di Cavalieri-Simpson

$$\mathcal{I}_{CS}(f) = \frac{(b-a)}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

Grado di precisione: 3

Formula composta di Cavalieri-Simpson

$$\mathcal{I}_{CS}^c(f) = \frac{H}{6} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + 4 \sum_{k=1}^N f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) + f(b) \right)$$

Errore: $E_{CS}^c(f) = I(f) - \mathcal{I}_{CS}^c(f) = -\frac{b-a}{180} \frac{H^4}{16} f^{(4)}(\xi_0)$

Formule di Gauss - Legendre

Nella tabella qui sotto, n indica il grado dei polinomi interpolanti.

n	nodii \hat{x}_i $i = 0, \dots, n$	pesi w_i $i = 0, \dots, n$
0	(0)	(2)
1	$(-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$	(1, 1)
2	$(-\sqrt{15}/5, 0, \sqrt{15}/5)$	(5/9, 8/9, 5/9)

n	G.d.P.	ordine
0	1	$CH^2 \max f^{(2)} $
1	3	$CH^4 \max f^{(4)} $
2	5	$CH^6 \max f^{(6)} $

Formula composta di Gauss

$$\mathcal{I}_G^c(f) = \frac{H}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{i=0}^n w_i f(x_{ki}) \quad H = \frac{b-a}{N}$$

essendo $x_{ki} = x_{k-1} + \frac{H}{2}(1 + \hat{x}_i)$.

Formule di Gauss - Legendre - Lobatto

n	nodi \hat{x}_i $i = 0, \dots, n$	pesi w_i $i = 0, \dots, n$
1	$(-1, 1)$	$(1, 1)$
2	$(-1, 0, 1)$	$(1/3, 4/3, 1/3)$
3	$(-1, -\sqrt{5}/5, \sqrt{5}/5, 1)$	$(1/6, 5/6, 5/6, 1/6)$

n	G.d.P.	ordine
1	1	$CH^2 \max f^{(2)} $
2	3	$CH^4 \max f^{(4)} $
3	5	$CH^6 \max f^{(6)} $

Formula composta di Gauss

$$\mathcal{I}_G^c(f) = \frac{H}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{i=0}^n w_i f(x_{ki}) \quad H = \frac{b-a}{N}$$

essendo $x_{ki} = x_{k-1} + \frac{H}{2}(1 + \hat{x}_i)$.

Function **quadratura**

La function **quadratura** calcola il valore approssimato dell'integrale di una funzione mediante le formule composite. Per usare la function dare il comando:

```
[I] =quadratura(f,a,b,N,metodo)
```

Input f nome della funzione da integrare;
a,b estremi dell'intervallo;
N numero degli intervalli di suddivisione;
metodo=1 uso punto medio;
metodo=2 uso trapezi;
metodo=3 uso Simpson.

Esercizio

Testare la function quadratura calcolando gli integrali:

$$\int_{-1}^2 x^4 dx = \frac{33}{5}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx = 2, \quad \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

Esercizio

Esercizio 1

Scrivere un programma di tipo script per valutare al variare di N (numero degli intervalli di suddivisione) e del metodo usato, l'errore di integrazione $E_{metodo,N}$

$$E_{metodo,N} = |I(f) - \mathcal{I}_{metodo,N}(f)|.$$

Riportare in un grafico in scala bilogarithmica l'errore in funzione di N . Testare il programma utilizzando gli integrali dati precedentemente.

L'ordine di convergenza è in accordo con la stima teorica dell'errore?

Function quadGL e quadGLL

Le function `quadGL` e `quadGLL` permettono di calcolare l'integrale di una funzione usando le formule di quadratura di Gauss-Legendre e di Gauss-Legendre-Lobatto rispettivamente.

Esercizio facoltativo

Ripetere l'esercizio precedente usando le formule di quadratura gaussiane.

Effetto della regolarità della funzione

Esercizio 2

Per $\alpha = n + 1/3$ si calcoli l'integrale

$$\int_0^3 |x^2 - 5|^\alpha dx$$

usando le formule di integrazione numerica implementate nella function `quadratura`. Per ciascuna formula individuare il valore di n per il quale la formula di integrazione numerica converge con l'ordine previsto dalla teoria.

Per calcolare l'errore usare come valore esatto quello fornito con il seguente comando di Matlab

```
quad(f, a, b, 1e-13)
```

L'integrazione numerica con MATLAB

Funzione	Significato
quad	Formula di Simpson adattativa.
quadl	Formula di Gauss-Lobatto adattativa.
quadgk	Quadratura adattativa Gauss-Kronrod funziona anche su intervalli illimitati
dblquad	Formula di quadratura per integrali doppi su rettangoli.
trapez	Calcola l'approssimazione di un integrale con la formula dei trapezi.

Indicazioni per l'uso

`quad` è più efficiente se usata con minore accuratezza per funzioni non regolari.

`quadl` è più efficiente di `quad` con elevata accuratezza per funzioni regolari.

quad, quadl

Sia **f** il nome della funzione di tipo `@`.

Calcolo di $\int_a^b f(x)dx$

```
>> q=quad(f,a,b)      formula di Simpson adattativa;
>> q=quadl(f,a,b)    formula di Gauss-Lobatto adattativa;
```

```
q=quadl(f,a,b,tol)
```

modifica il valore della tolleranza usata (default 1.e-6).

```
[q,fcnt]=quadl(f,a,b)
```

restituisce il numero di valutazioni della funzione.

```
[q,fcnt]=quadl(f,a,b,[],trace)
```

se **trace** assume un valore diverso da zero, vengono mostrati i valori di `[fcnt a b-a Q]` durante il procedimento. Le parentesi `[]` servono per tenere il posto della tolleranza ed usare il suo valore di default.

Function `trapz`

$$Z = \text{trapz}(X, Y)$$

calcola l'integrale di una funzione data per punti essendo **X** il vettore delle ascisse e **Y** il vettore dei corrispondenti valori della funzione.

Formule adattative

Il passo di integrazione H può essere scelto in modo da garantire che l'errore sia inferiore ad una **tolleranza** ε prestabilita.
Se usiamo la formula di Simpson si dovrebbe trovare H tale che

$$\frac{b-a}{180} \frac{H^4}{16} M < \varepsilon, \quad \text{essendo } M = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

La funzione $\arctan(ax)$

Sia $f(x) = \arctan(ax)$, allora si ha

$$f^{(4)}(x) = -\frac{24a^7x^3 - 24a^5x}{(a^2x^2 + 1)^4}$$

$$\int_{-1}^5 f(x) dx = \left[x \arctan(ax) - \frac{1}{2a} \log(a^2x^2 + 1) \right]_{-1}^5$$

Esercizio 3

- ▶ Per $a = 1$ ed $a = 5$, fare il grafico della funzione $f(x) = \arctan(ax)$ e della sua derivata quarta sull'intervallo $[-1, 5]$ in due figure differenti.
- ▶ Determinare numericamente

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 5} |f^{(4)}(x)|$$

e trovare il valore di H per cui l'errore è minore di $\text{tol}=1.e-6$ per $a = 1$ e $a = 5$.

- ▶ Calcolare il valore dell'integrale usando la formula di Cavalieri-Simpson composta con il valore di H trovato al punto precedente.
- ▶ Confrontare l'errore relativo ottenuto ed il numero di valutazioni della funzione effettuate con quelli dati dalla funzione `quad` di Matlab.
- ▶ Calcolare l'errore che si ottiene usando il metodo di Cavalieri-Simpson con lo stesso numero di valutazioni della funzione richiesto da `quad`.